



AVERTISSEMENTS AGRICOLES[®]

DLP 12-11-01009019

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

AUVERGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°33 du 11 octobre 2001 - 1 page

COLZA

Stade : 5 feuilles à 10 feuilles

Tenthredes

Les adultes deviennent très rares et les larves sont toujours peu nombreuses dans la majorité des parcelles. Aucune intervention.

Pucerons verts

Les populations n'ont pas évolué en une semaine et la plupart des parcelles semées en août ont maintenant dépassé le seuil de sensibilité. Dans les parcelles levées en septembre le seuil d'intervention n'est pas atteint.

Charançon du Bourgeon terminal

Malgré la faiblesse des attaques ces dernières années, le charançon du bourgeon terminal (*Ceutorhynchus picipitarsis*) peut causer des dégâts localisés importants.

Après la diapause estivale, les adultes reprennent leur activité sur les colzas dans le courant du mois d'octobre. Après 10 à 15 jours, les femelles pondent leurs œufs dans les pétioles des feuilles. Après éclosion les larves (corps trapu et arqué de couleur blanc avec tête marron clair) migrent rapidement dans le cœur de la plante où elles peuvent provoquer la destruction du bourgeon terminal. N'ayant aucun produit véritablement efficace contre les larves, la lutte s'effectue en empêchant les adultes de pondre. Pour ceci le piégeage avec les cuvettes jaunes permet de déterminer la date d'arrivée des adultes et ainsi de positionner le traitement avant le début des pontes.

Les premières captures ont été observées en début de semaine dans certains secteurs de notre réseau de piégeage (Loriges, Joze.) et devraient se généraliser avec les quelques jours de beau temps que l'on connaît actuellement. En cas de captures importantes et de colza à un stade végétatif peu avancé (5 à 6 feuilles) une intervention doit être positionnée 10 à 15 jours après les premières captures. Choisissez un produit également efficace sur tenthrèdes et pucerons. Dans les autres situations, le traitement ne sera pas rentabilisé. N'oubliez pas de laisser un témoin non traité pour vérifier le taux d'attaque.

CEREALES

Stade : Semis en cours à deux feuilles.

Pucerons

Dans les parcelles levées du département de l'Allier, leur présence est généralisée dès le stade une feuille. Ne laissez pas vos parcelles sans surveillance car le seuil d'intervention est parfois dépassé. Seuil d'intervention : 10 % de pieds porteurs.

Cicadelles

L'année dernière nous avons observé des dégâts de cicadelles dans les parcelles de blé semées avant le 20 octobre dans les terrains argilo-calcaires.

Cette année on retrouve les cicadelles dans les repousses de céréales et dans les cuvettes jaunes.

Dans les terrains argilo-calcaires, attendez au moins le 20 octobre pour semer.

Colza

Charançon
bourgeon
terminal.

Céréales

Pucerons

Service Régional de
la Protection des
Végétaux
Site de Marmilhat BP 45
63370 LEMPDES
Tél. 04.73.42.14.83
Fax 04.73.90.83.70

Imprimé à la Station
d'Avertissements
Agricoles de la DRAP
AUVERGNE

Le Directeur gérant :
D. DIDELOT

Publication périodique
C.P.A.P n°23145AD
ISSN n°1254.6372

Tarifs : Courrier : 350 F
Fax : 320 F